

## آمار و ارقام افراد سیگاری

10 میلیون سیگاری کشور، روزانه ۴ میلیارد تومان را دود می کنند.

\* درآمد سالانه يك کارخانه سیگار آمریکایی معادل ۱۵ سال فروش نفت ایران است.

\* مصرف هر يك نخ سیگار ، ۵.۵ دقیقه از عمر انسان می کاهد.

\* دخانیات بیش از حوادث رانندگی ، مصرف مشروبات الکلی ، آدمکشی ، سوءاستفاده از داروها ، خودکشی و آتش سوزی در جهان موجب مرگ و میر انسانها می شود.

\* سالیانه نزدیک به ۵۰/۰۰۰ نفر بعلت عوارض سیگار در ایران فوت می شوند و هزینه ناشی از مصرف سیگار در ایران رقمی بالغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (( چهارصد میلیارد )) تومان می باشد.

\* نیکوتین ماده موثر و اصلی توتون ولی جز کوچکی از دود سیگار است و بیش از ۴۳ ماده سرطانزای دیگر نیز در دود سیگار وجود دارد.

60%\* از افراد سیگاری از سنین ۱۵ تا ۱۶ سالگی سیگار کشیدن را آغاز می کنند و ۹۰% آنان از ۲۰ سالگی به مصرف سیگار ادامه می دهند و به آن وابسته می شوند.

\* طبق اطلاعات منتشره توسط سازمان جهانی بهداشت سالیانه از ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد کمپانیهای دخانیات ۲۰۰ میلیارد دلار آن سود خالص می باشد.

\* طبق آمار سال ۱۹۹۵ بانک جهانی شیوع کلی مصرف دخانیات در کشورهای در حال توسعه ۴۹ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۳۸ درصد بوده است.

\* دود سیگار حاوی ۴۰۰۰ نوع ماده با آثار آنتی ژنی ، جهش زایی و سرطان زایی ، دارویی و ضد سلولی است.

\* روزانه ۱۵ میلیارد نخ سیگار در سراسر جهان خریداری میشود، به عبارت دیگر هر دقیقه ۱۰ میلیون نخ و یا ۵.۶ تریلیون نخ در سال.

\* مصرف مواد دخانی در هر ۸ ثانیه یک نفر را می‌کشد و سالانه ۴ میلیون مرگ و یا حدود ۱۰ هزار مرگ روزانه در پی دارد.

\* تا سال ۲۰۲۰ دخانیات سالی ۱۰ میلیون قربانی در جهان خواهد داشت که ۷ میلیون آن در کشورهای در حال توسعه است.

\* میزان کل تولید برگ تنباکوی جهان در سال ۲۰۰۵ به ۶.۳۸ میلیون تن بالغ می‌گردد.

\* روزانه هشت تا ده هزار نفر از نوجوانان در جهان کشیدن سیگار را آغاز می‌کنند.

\* سیگار کشیدن خطراتی وخیم برای سلامت مادر و جنین ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و مرگ ناگهانی نوزاد شود.

\* آمار به دست آمده نشان می‌دهد که افراد سیگاری چیزی در حدود ۹۷.۶ میلیارد دلار بابت تلف شدن بازدهی برای اقتصاد هزینه در بردارند. این عدد مبتنی بر از دست رفتن سالهای کار به خاطر مرگ های زودرس می باشد. طبق این آمار، بقیه ۹۶.۷ میلیارد دلار برای مراقبت های عمومی و بهداشتی مربوط صرف می شود و هر خانوار امریکایی باید سالانه ۶۳۰ دلار برای سیگار کشیدن مالیات بدهد.

\* تحقیقات بیشماری نشان می‌دهد که افراد سیگاری ۴ تا ۱۱٪ کمتر از افراد عادی درآمد دارند. البته سیگار کشیدن فقط با پایین آمدن بازدهی کاری و وضعیت سلامتی هزینه ارتباط ندارد. محققان دریافته اند که افراد سیگاری نسبت به افراد عادی جذابیت کمتری دارند و کمتر در زندگی موفق هستند.

\* یک تغییر مهم دیگری که در صنعت دخانیات به وقوع پیوسته، کاهش میزان برگ توتون موجود در سیگار به حدود ۲۵ درصد مقداری است که قبل از سال‌های دهه ۵۰ استفاده می شده است. اجزای دیگر گیاه تنباکو تا آن زمان دور ریخته می‌شد، اما با پیشرفت صنعت دخانیات، از این اجزا هم در

ترکیب توتون سیگار استفاده می‌گردد. در حال حاضر حداقل یک چهارم توتونی که در یک نخ سیگار وجود دارد، از همین اجزای دیگر گیاه تنباکو است و نه کاملاً از برگ‌های خالص گیاه.

\* پیشرفت دیگری که باعث شد تولید کنندگان دخانیات از برگ توتون به میزان بسیار کمتری در محصولاتشان استفاده کنند، رایج شدن تکنیک دیگری موسوم به "پف‌دادن" بود. در این روش، توتون را به صورت خشک منجمد می‌کنند و بعد هوا یا گاز دیگری مثل دی‌اکسیدکربن را با فشار به آن می‌دمند. به این ترتیب برگ‌های توتون حالت پف کرده به خود می‌گیرد و حجیم تر و سبک تر می‌شود و افزودنی‌ها را هم بهتر و بیشتر به خود جذب می‌کند.

\* خانم‌های سیگاری تقریباً ۷۲٪ قدرت باروری خانم‌هایی که سیگار نمی‌کشند را دارا می‌باشند.

\* به تازگی مشخص شده کارخانه‌های بزرگ و معروف تولید سیگار جهت افزایش مصرف و فروش بیشتر، ترکیبات اعتیادآور دیگری را نیز به طور پنهانی به سیگار اضافه می‌کنند.

87٪\* از مرگ‌هایی که به خاطر سرطان ریه اتفاق می‌افتد ناشی از مصرف سیگار است.

95٪\* از مرگ‌هایی که به خاطر بیماری (emphysema نوعی بیماری ریوی که سبب نفس تنگی می‌شود)، رخ می‌دهد، ناشی از مصرف سیگار است.

\*افراد سیگاری ۲۰٪ - ۳۰٪ غیر سیگاری‌ها احتمال ابتلا به سرطان دهان و حنجره را دارند. افراد سیگاری ۲ برابر غیر سیگاری‌ها احتمال ابتلا به حمله قلبی و مرگ از طریق آن را دارند.

\*افراد سیگاری ۲ برابر غیر سیگاری‌ها احتمال ابتلا به زخم معده را دارند.

\*در افرادی که فشار خون یا کلسترول بالا دارند، مصرف سیگار احتمال مرگ را به ۲ برابر افزایش

می‌دهد.

\*افراد سیگاری به طور متوسط ۸-۵ سال زودتر از افراد غیر سیگاری ( در شرایط یکسان)، جان خود را از دست می دهند.

\*استعمال سیگار در زنان باردار سبب مرگ تقریباً ۴/۰۰۰ نوزاد در سال می شود.

\*در سال ۱۹۹۶ از کل زباله های جمع آوری شده در امریکا ۲۰ درصد مربوط به ته سیگار بوده است.

\*هر سیگار بطور متوسط حداقل ۷ دقیقه از عمر متوسط فرد سیگاری می کاهد.

\*آمار افراد سیگاری در دنیا حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر است که ۸۰۰ میلیون نفر آنها

شهروندان کشورهای در حال توسعه هستند.

\*سیگار در حاملگی عامل حدوداً ۲۰ تا ۳۰ درصد کم شدن وزن نوزادان در موقع تولد می باشد، ۱۴

درصد عامل زود دنیا آمدن و متأسفانه ۱۰ درصد مرگ نوزادان را باعث می شود. حتی می توان گفت

نوزادان سالم و به موقع به دنیا آمده افراد سیگاری گاهی از بدو تولد دارای مجاری تنفسی باریک و

ریه های کوچک و کوتاه می باشند.

\*بر طبق تخمین دپارتمان تحقیق اقتصادی که کشاورزی آمریکا متجاوز از ۵ بلیون نخ سیگار در

سال ۲۰۰۶ مصرف شده است.